

2 SEPTEMBER 2022

BULLETIN

VOLKSGEZONDHEID | SANTÉ PUBLIQUE

Kort overzicht van de Belgische cijfers m.b.t. COVID-19 en apenpokken

A. INFORMATIE OVER COVID-19

De coronacijfers blijven voorlopig de goede kant uitgaan. We verwachten wel nog steeds een stijging in het najaar. Uit nieuwe berekeningen* blijkt dat de impact van een nieuwe najaarsgolf significant gereduceerd kan worden door een hoge opname (>50%) van de herfstprik bij 50-plussers, zodat bij deze kwetsbare groep ziekenhuisopnames zoveel mogelijk worden beperkt. Bij jongere mensen vermindert vaccinatie de kans op (mildere) ziekte, long COVID en uitval op het werk. Vaccinatie blijft daarmee het allerbelangrijkste wapen in onze strijd tegen COVID-19. Twijfel dus niet om uw herhalingsprik te halen in de komende maanden!

*<https://covid-en-wetenschap.github.io/2022/08/technical-note-simid-august>

Prof. Dr. Steven Van Gucht

1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 23 tot 29 augustus)

De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 207/100.000 inwoners.

De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 4/100.000 inwoners.

- 25%

Nieuwe gevallen

- **Het aantal nieuwe gevallen** is gedaald (-25%) tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het reproductiegetal R_t , dat berekend wordt op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, ligt opnieuw onder de 1 (0,905).
- **Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames** is verder gedaald (-17%) in de week van 26 augustus tot 1 september, tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het aantal bezette bedden op intensieve zorgen is ook gedaald (-15%).
- **De COVID-19 mortaliteit** is eveneens gedaald. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats.
- **Surveillance door huisartsen:** Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 blijft stabiel (13 contacten per 100 000 inwoners per dag, in vergelijking met 12 contacten in de week daarvoor). De incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten is over het algemeen nog stabiel gebleven, met 78 consulten per 100 000 inwoners per week.
- **Surveillance in woonzorgcentra:** de epidemiologische situatie vertoont een licht dalende trend bij het aantal nieuwe gevallen onder WZC-bewoners en onder personeelsleden, bij het aantal nieuwe ziekenhuisopnames onder WZC-bewoners, en bij het aantal clusters.

- 17%

Nieuwe
ziekenhuisopnames

- In de afgelopen 2 weken (van 15 tot 28 augustus 2022) vertegenwoordigden Omikron variant BA.1/BA.1.1 0,18%, **Omikron-varianten** BA.2 0,54%, BA.4 4,14%, en **BA.5 94,78%**. De Omikron-variant BA.2.12.1 werd niet gedetecteerd in deze periode.

Bron: Sciensano

2. Testen en positiviteitsratio (week van 23 tot 29 augustus)



Het aantal uitgevoerde testen is licht gedaald, met een gemiddelde van meer dan 7.500 testen per dag. De positiviteitsratio bleef dalen (21,7 %).

3. Vaccinatie tegen COVID-19

Op 30 augustus bedroeg de vaccinatiegraad voor een tweede booster bij personen ouder dan 85 jaar 47,8%. In totaal ontvingen ruim 602.000 inwoners van ons land (5,2%) een 2e booster.

Gezien de relatief hoge besmettingsrisico's, de kwetsbaarheid van de patiëntenpopulatie, enz kan het ziekenhuispersoneel, de zorgverleners van de eerste lijn en het personeel in de woonzorgcentra nu ook al een extra booster krijgen.

Daarnaast hebben ze de zekerheid dat ze later nog een aangepast vaccin kunnen krijgen, minstens 3 maanden na deze extra booster. Zij die op dit huidige aanbod niet ingaan, worden vanaf eind september voor de herfstcampagne individueel uitgenodigd, om een vaccin toegediend te krijgen in een vaccinatiecentrum.

Op 1 september zette het EMA het licht op groen voor de aangepaste coronavaccins van Pfizer en Moderna.

Meer details vindt u in het wekelijkse rapport van Sciensano, dat elke vrijdagmorgen wordt gepubliceerd [COVID-19 - Epidemiologische situatie | Coronavirus Covid-19 \(sciensano.be\)](https://sciensano.be) en het Dashboard: <https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB>

4. Aantal besmettingen bij werkenden daalt, maar laagste niveau van mei-juni nog niet bereikt

De gemiddelde 14-dag incidentie in de werkende bevolking is verder met 26% gedaald t.o.v. de vorige periode (02/08-15/08). De incidentie bij de werkenden lag in augustus net onder het niveau van die van de algemene bevolking. De incidenties in alle sectoren blijven dalen, maar iets minder scherp dan in juli.

Het hoogste aantal besmettingen is nog steeds te vinden in de zorg en de sociale sector. De transportsector doet het in de laatste weken beter. Net voor de schoolstart en terugkeer uit vakantie liggen de cijfers dus laag, maar we hebben nog niet het laagste niveau bereikt dat we dit jaar konden optekenen in de periode van einde mei-begin juni.

De onderzoekers blijven de trend opvolgen, om de impact na te gaan van het openen van de scholen op de sectoren en van de vaccinaties op de beroepsgroepen, zoals het zorgpersoneel.

Om een stijging van infecties en uitval van personeel te voorkomen, wordt aanbevolen dat:

- werknemers zich laten testen bij symptomen
- werknemers thuisblijven bij symptomen, met thuiswerk indien mogelijk
- werknemers een masker dragen na hoog risico contact (bv ziek gezinslid)
- binnenruimtes goed worden geventileerd
- vaccinatie wordt aangemoedigd

Meer info vindt u [hier](#).

Bron: Monitoring Belgian COVID-19 infections in work sectors in 2022, Version 41 (31 August 2022)

Geert Molenberghs (1,2), Johan Verbeeck (1), Godelieve Vandersmissen (3), and Lode Godderis (3,4)

1 Data Science Institute, I-BioStat, Universiteit Hasselt, Hasselt, Belgium

2 I-BioStat, KU Leuven, Leuven, Belgium

3 IDEWE, External Service for Prevention and Protection at Work, Heverlee, Belgium

4 Centre for Environment and Health, Department of Public Health and Primary Care, KU Leuven, Leuven, Belgium


B. INFORMATIE OVER APENPOKKEN

Monkeypox of Apenpokken wordt veroorzaakt door het monkeypoxvirus. Tot nu toe kwam de ziekte vooral voor in beboste delen van Centraal- en West-Afrika, met sporadisch gevallen in andere landen, gelinkt aan een reis naar deze gebieden. Sinds begin mei 2022 verspreidt de ziekte zich echter in Europa en daarbuiten, waarbij besmettingen vooral voorkomen bij mannen die seksuele contacten hebben met mannen (MSM), maar niet uitsluitend.

1. Aantal gevallen

Op 29 augustus 2022 waren er in ons land 706 bevestigde gevallen van apenpokken. Het gaat om 376 gevallen in Vlaanderen (53%), 253 gevallen in Brussel (36%) en 77 gevallen in Wallonië (11%). Bij de gevallen zijn er 699 mannen, 2 vrouwen, en 2 personen die zich anders identificeren. De leeftijd voor de grote meerderheid situeert zich tussen de 16 en 71 jaar oud. Er is 1 geval gemeld bij een kind onder de drie jaar.

Figuur : Aantal gevallen per regio per week sinds 10 mei 2022, België (data laatste 3 weken nog niet volledig)



Zo goed als alle patiënten vertonen huidletsels, vooral in de anogenitale zone. Ongeveer 58% heeft ook algemene symptomen zoals koorts, algemeen onwel zijn, opgezwollen lymfeklieren,

Tweëndertig personen werden gehospitaliseerd, 24 om te worden behandeld (waarvan 2 personen met een onderliggende immunestoornis), 3 personen omdat thuisisolatie niet mogelijk was, en 5 waarvoor de reden niet gekend was.. Er werd tot op heden 1 sterfgeval gerapporteerd bij een persoon met onderliggende gezondheidsproblemen.

Op basis van de huidige gegevens over de vermoedelijke bron van transmissie blijkt dat het virus voornamelijk wordt overgedragen via seksueel contact. Waar in het begin infectie voornamelijk via seksueel contact op grote events werd gemeld, gebeurt dat meer recent meer via seksueel contact in de privésfeer.

Heel soms wordt het ook overgebracht door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld beddengoed). Het virus kan dan binnendringen via de slijmvliezen en kleine wondjes in de huid. Het zou kunnen dat het virus zich ook verspreidt via druppels uit blaasjes of uit de mond/keelholte, hoewel deze kans momenteel als laag wordt ingeschat. Het risico voor de algemene bevolking wordt vandaag nog als gering ingeschat.

2. Vaccinatie

Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) laat nu toe dat de lidstaten tijdelijk het vaccin in de huid (intradermaal) injecteren. Ook de Hoge Gezondheidsraad gaf hierover een positief briefadvies. Voor een intradermale vaccinatie is slechts een vijfde van de dosis nodig, met twee vaccinaties met vier weken tussentijd.

In de loop van volgende week zullen de 12 referentiecentra beginnen met deze methode, en de week erna kan het ook op andere plaatsen. Van dan af wordt iedereen intradermaal gevaccineerd, behalve bij mensen met immuunstoornissen. Daarnaast gaf Nederland ons deze week 1.500 vaccins in bruikleen. Door dit alles kunnen de voorwaarden voor preventieve vaccinatie worden versoepeld:

- Preventieve vaccinatie bij
 - mannen die seks hebben met mannen (MSM) en die de voorbije 12 maanden minstens één labo-bewezen SOA hadden (ipv minstens 2 SOA's voordien);
 - vrouwen die PrEP nemen en die frequente wisselende seksuele contacten hebben;
 - mannelijke en transgender sekswerkers
 - personen met ernstige immuunstoornissen en een hoge kans op ernstige infectie;
 - laboratoriumpersoneel dat virusculturen behandelt
- Vaccinatie na blootstelling (best binnen de 4 dagen na het contact) bij
 - immuungecompromitteerden na een hoogrisico contact (bv besmet gezinslid of het delen van kleding, beddengoed, keukengerei met een patiënt met huiduitslag);
 - personen na een zeer hoogrisico contact (bv. seksueel contact, langdurig huid-op-huidcontact met een persoon met huiduitslag of een wonde);
 - zorgpersoneel na een hoogrisico contact zonder bescherming (bv langdurig face-to-facecontact, in aanraking komen met lichaamsvloeistoffen van een besmette patiënt, blootstelling aan aërosolen).



57%

van de doses voor preventieve vaccinatie werd toegediend/ingepland



384

doses werden toegediend na blootstelling (PEV)

De 12 referentiecentra zullen vanaf volgende week de patiënten uitnodigen waarvan ze weten dat deze binnen de nieuwe voorwaarden vallen. Mensen die niet gekend zijn in een referentiecentrum en die denken voor vaccinatie in aanmerking te komen kunnen vanaf volgende week contact opnemen met de (huis)arts die hun dossier kent en hun SOA behandelde het afgelopen jaar.

Hoeveel vaccins werden er al toegediend in België? (cijfers van 30/8)

Van de beschikbare 3.220 vaccins, zijn er 747 voorbehouden voor zogenaamde PEV, na blootstelling. Hiervan werden er 384, dus meer dan de helft, toegediend. Van de resterende 2.473 vaccins, die bedoeld zijn voor preventief gebruik, werden er reeds 1.181 toegediend, en er zijn er deze week nog 150 ingepland. Dit betekent dat 57 % van de preventieve vaccins reeds zijn toegewezen. Bij het opmaken van deze planning werd nog geen rekening gehouden met de extra leveringen hierboven vermeld.

Aantal vaccinaties per deelstaat (niet noodzakelijk de deelstaat waar de gevaccineerde woont, cijfers van 30/8):

- Vlaanderen: 801
- Brussel: 620
- Wallonie: 144

3. Nuttige info

Een wekelijkse epidemiologische update vindt u [op de website van Sciensano](#). Informatie voor het grote publiek is beschikbaar op de website van het Vlaamse [Agentschap Zorg en Gezondheid](#) en van de Brusselse [Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie](#).

Elke deelstaat voorziet ook een hulplijn:

- Vlaanderen: 1700
- Brussel: 02/214.19.29
- Wallonië: 0800/16.061
- Ost België: 0492/140 557

C. BESLISSINGEN VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE (IMC) VOLKSGEZONDHEID

Alle persberichten van de IMC kan u vinden via de volgende link:

<https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2022-persberichten-van-de-imc>

Voor meer informatie of interviews, contacteer:

Gudrun Briat

Verantwoordelijke communicatie COVID-19

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0475/274115

Gudrun.briat@health.fgov.be