

5 AUGUSTUS 2022

BULLETIN

VOLKSGEZONDHEID | SANTÉ PUBLIQUE

Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en actualiteit ivm volksgezondheid

A. INFORMATIE OVER COVID-19



1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 26 juli tot 1 augustus)



- 12%

Nieuwe gevallen



- 21%

Nieuwe
ziekenhuisopnames

De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 464/100.000 inwoners.

De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 8/100.000 inwoners.

- **Het aantal nieuwe gevallen** is verder gedaald, maar minder sterk (-12%) ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen. Voor dezelfde periode is het reproductiegetal R_t , dat berekend wordt op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen nu licht gestegen maar het blijft onder 1 (0,883).
- **Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames** is verder gedaald (-21%) in de week van 29 juli tot 4 augustus, tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het aantal bezette bedden op **intensieve zorgen** is gestegen (+19%).
- **De COVID-19 mortaliteit** is licht gedaald. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. In week 28 (11 -17 juli) was er geen statistisch significante oversterfte.
- **Surveillance door huisartsen:** Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 is verder gedaald (24 contacten deze week per 100 000 inwoners per dag, vergeleken met 29 contacten in de week daarvoor). De incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten is toegenomen, tot 110 consulten per 100 000 inwoners per week..
- **Surveillance in woonzorgcentra:** de epidemiologische situatie blijft een licht dalende trend vertonen, van het aantal nieuwe gevallen onder WZC-bewoners en onder personeelsleden, van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames onder WZC-bewoners en van een daling van het aantal clusters.

- In de afgelopen 2 weken (van 18 tot 31 juli 2022) vertegenwoordigen **Omikron-varianten** BA.2 0,58%, BA.2.12.1 0,49%, BA.4 4,29%, en **BA.5 94,64%**. Omikron variant BA.1/BA.1.1 werd niet meer gedetecteerd in de geanalyseerde stalen.

Bron: Sciensano

2. Testen en positiviteitsratio (week van 26 juli tot 1 augustus)



Het aantal uitgevoerde testen is zeer licht gedaald, met een gemiddelde van ruim 13 000 testen per dag. De positiviteitsratio bleef ook lichtjes dalen (30 %)

Bron: Sciensano

3. Vaccinatie tegen COVID-19

Op 2 augustus bedroeg de vaccinatiegraad voor een tweede booster bij personen ouder dan 85 jaar 45%. In totaal ontvingen ruim 562.000 inwoners van ons land (4,85 %) een 2e booster.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) roept alle personen die nog geen tweede booster hebben gehaald op om dit alsnog te doen, in het belang van hun eigen gezondheid en om ons gezondheidszorgsysteem niet te belasten.

Gezien de relatief hoge besmettingsrisico's, de kwetsbaarheid van de patiëntenpopulatie, enz kan het ziekenhuispersoneel, de zorgverleners van de eerste lijn en het personeel in de woonzorgcentra in juli en augustus al een extra booster krijgen.

Meer details vindt u in het wekelijkse rapport van Sciensano, dat elke vrijdagmorgen wordt gepubliceerd [COVID-19 - Epidemiologische situatie | Coronavirus Covid-19 \(sciensano.be\)](https://www.sciensano.be/nl/COVID-19-Epidemiologische-situatie-Coronavirus-Covid-19) en het Dashboard:

<https://datastudio.google.com/embed/spotting/14a5cto-cab7-4812-84bc-0369173146ab/page/ZwvCB>

B. ANDERE INFORMATIE

Apenpokken

Sinds begin mei 2022 worden er in meerdere landen (binnen de EU en daarbuiten) gevallen van apenpokken ('monkeypox') gemeld, zonder link met een reis naar een endemisch land (in West- en Centraal Afrika).

Op 1 augustus 2022 waren er in ons land 482 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld. Het gaat om 261 gevallen in Vlaanderen (54%), 172 gevallen in Brussel (36%) en 49 gevallen in Wallonië (10%). Alle gevallen waarvan het geslacht gekend is zijn mannen, tussen 16 en 71 jaar oud.

Zo goed als alle patiënten vertoonden huidletsels, vooral in de anogenitale zone. Ongeveer driekwart had ook algemene symptomen zoals koorts, algemeen onwel zijn, opgezwollen lymfeklieren,

Achtentwintig personen werden gehospitaliseerd, 21 om te worden behandeld (waarvan 1 persoon met een onderliggende immuunstoornis), twee personen omdat thuisisolatie niet mogelijk is, en vijf waarvoor de reden niet gekend was. Geen enkele hospitalisatie leidde tot een opname op intensieve zorgen. Er zijn geen sterfgevallen.

Op basis van de huidige gegevens over de vermoedelijke bron van transmissie blijkt dat het virus voornamelijk wordt overgedragen via seksueel contact tussen mannen.

Een regelmatige update vindt u [op de website van Sciensano](#).

Zorgverleners en personen die een onbeschermd hoog risico contact hadden met een besmette persoon kunnen zich laten vaccineren tegen apenpokken, in één van de 9 referentiecentra. Deze vaccinatie gebeurt best binnen de 4 dagen na het contact. De mensen die niet tegen de klassieke pokken zijn ingeënt, moeten twee doses krijgen, met minstens 28 dagen tussentijd. Wie denkt voor vaccinatie in aanmerking te komen, kan best contact opnemen met zijn (huis)arts die met het referentiecentrum kan overleggen of men in aanmerking komt. Door het beperkte aantal vaccins en de huidige onzekerheid over extra leveringen gebeurt deze vaccinatie onder strikte voorwaarden.

C. BESLISSINGEN VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE (IMC) VOLKSGEZONDHEID

Alle persberichten van de IMC kan u vinden via de volgende link:

<https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2022-persberichten-van-de-imc>

Voor meer informatie of interviews, contacteer:

Guðrun Briat

Verantwoordelijke communicatie COVID-19

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0475/274115

Guðrun.briat@health.fgov.be