



Informatie voor huisartsen, pediaters en gespecialiseerde poliklinieken voor de identificatie van kinderen (5 tot 11 jaar) met het syndroom van Down, met het oog op vaccinatie tegen COVID-19

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 20 december 2021 zette het licht op groen voor de COVID-19 vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar. Deze vaccinatie wordt aanbevolen voor kinderen met comorbiditeiten of voor kinderen die in nauw contact staan met risicopersonen. Deze groep zal niet als absolute prioriteitsgroep worden uitgenodigd voor vaccinatie, maar huisartsen en pediaters kunnen de betrokken kinderen in hun praktijk identificeren en hen aanmoedigen zich te laten vaccineren.

Om ervoor te zorgen dat risicokinderen, ongeacht hun leeftijd, zo snel mogelijk worden uitgenodigd, zal hetzelfde systeem worden gebruikt als voor het prioriteren van de kinderen van 12 tot 15 jaar met comorbiditeiten. Ter herinnering: hiervoor zal de "webapp voor coronavaccinatie" kunnen worden gebruikt door pediaters in pediatrie referentieziekenhuizen. Hiermee kunnen zij - op basis van het rijksregisternummer - de patiënten met aandoeningen die voorkomen op de lijst van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid informeren. Ze worden dan spoedig uitgenodigd voor vaccinatie in een vaccinatiecentrum.

Hierop zijn er echter een paar uitzonderingen:

- Kinderen die bedlegerig zijn en/of voldoen aan strikte medische indicaties (bv. ernstige psychiatrische stoornissen, ernstige lichamelijke beperkingen) en die onder normale omstandigheden hun woonplaats niet kunnen verlaten. Zij kunnen thuis worden gevaccineerd door het mobiele team van het vaccinatiecentrum of door hun huisarts/pediater (of, in uitzonderlijke gevallen, op de kinderafdeling van een ziekenhuis, indien nodig).
- Kinderen die chronische nierdialyse ondergaan, kunnen zich laten vaccineren in het dialysecentrum.

De pediatrie centra van de referentieziekenhuizen kunnen de meeste kinderen met de betrokken pathologieën identificeren. Kinderen met het syndroom van Down zijn echter niet altijd bekend bij deze ziekenhuizen, omdat ze soms alleen worden gevolgd door hun huisarts of pediater, of in een gespecialiseerde polikliniek.

Daarom worden de huisartsen/pediaters of gespecialiseerde poliklinieken verzocht om elk kind van 5 tot 11 jaar met het syndroom van Down te identificeren, ongeacht de ernst van de aandoening, en het rijksregisternr van dit kind door te geven aan een pediater in een referentieziekenhuis (zie tabel hieronder) om het toe te voegen aan de "webapp voor coronavaccinatie". Op die manier kan het kind tijdig worden uitgenodigd voor vaccinatie in een vaccinatiecentrum.

Siel Daelmans	UZ Brussel	Siel.Daelemans@uzbrussel.be
Ann De Guchtenaere	AZ Damiaan	dr.deguchtenaere@gmail.com
Julie Frere	CHR Citadelle	julie.frere@chrcitadelle.be



Marc Raes	Jessa Ziekenhuis	fa303885@skynet.be
Petra Schelstraete	UZ Gent	Petra.Schelstraete@uzgent.be
Pierre Smeesters	HUDERF	pierre.smeesters@huderf.be
Anne Tilmanne	CHU Tivoli	atilmann@chu-tivoli.be
Stijn Verhulst	UZ Antwerpen	Stijn.Verhulst@uza.be
Dimitri Van der Linden	UCL Saint-Luc	dimitri.vanderlinden@saintluc.uclouvain.be
François Vermeulen	UZ Leuven	francois.vermeulen@uzleuven.be

Daarnaast wordt de huisarts/pediater of gespecialiseerde polikliniek verzocht om de ouders of voogd van het kind te informeren dat zij binnenkort per mail een uitnodiging voor vaccinatie zullen ontvangen. Het is belangrijk om hen goed te informeren over de reden van de uitnodiging, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken over de vaccinatie.

Het vaccin dat voor kinderen van 5 tot 11 jaar wordt gebruikt, is het pediatrische vaccin van Pfizer (2 doses met een interval van 21 dagen).