

16 september 2022

# BULLETIN

VOLKSGEZONDHEID | SANTÉ PUBLIQUE

## Kort overzicht van de Belgische cijfers m.b.t. COVID-19 en apenpokken

### A. INFORMATIE OVER COVID-19

*De besmettingen nemen opnieuw licht toe, vooral in Wallonië en bij kinderen. Alle besmettingen worden momenteel nog steeds door omicronvarianten (vooral BA.5 en in mindere mate BA.4 en BA.2.75) veroorzaakt. Het herfstvaccin dat sinds deze week wordt toegediend, vertoont een relatief goede match met de virussen in omloop en zal naar alle verwachting een goede bijkomende bescherming geven tegen COVID-19 in het komende najaar en winterseizoen.*

Prof. Dr. Steven Van Gucht

### 1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 6 tot 12/9/22)

+ 8%

Nieuwe gevallen

De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 194/100.000 inwoners.

De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 3,4/100.000 inwoners.

- **Het aantal gerapporteerde nieuwe gevallen** is nu licht gestegen (+8%) ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen. Het reproductiegetal  $R_t$ , dat berekend wordt op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, bleef ook toenemen en is nu boven 1 (1,053).
- **Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames** is licht gedaald (-7%) in de week van 9 tot 15 september, tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het aantal bezette bedden op **intensieve zorgen** blijft stabiel (+2%).
- **De COVID-19 mortaliteit** is licht gestegen. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. Week 34 vertoonde één dag van oversterfte in de algemene bevolking.
- **Surveillance door huisartsen:** Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 is toegenomen (18 contacten deze week per 100 000 inwoners per dag, in vergelijking met 13 contacten in de week daarvoor). De incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten is gedaald, met 44 consulten per 100 000 inwoners per week.
- **Surveillance in woonzorgcentra:** de epidemiologische situatie vertoont een lichte daling van het aantal nieuwe gevallen en het aantal nieuwe ziekenhuisopnames onder WZC-bewoners, net als van het aantal nieuwe gevallen onder personeelsleden en van het aantal clusters.

- 7%

Nieuwe  
ziekenhuisopnames

- **Afvalwatersurveillance:** de virale ladingen gedetecteerd in het afvalwater nemen licht toe, maar ze blijven op een laag niveau
- In de afgelopen 2 weken (van 29 augustus tot 11 september 2022) vertegenwoordigden Omikron-varianten BA.2 1,6%, BA.4 4,26%, **en BA.5 94,15%**. De Omikron-varianten BA.1/BA.1.1 en BA.2.12.1 werden niet gedetecteerd.

## 2. Testen en positiviteitsratio (week van 6 tot 12/9/22)



Het aantal uitgevoerde testen blijft licht stijgen, met een gemiddelde van 8.749 testen per dag. De positiviteitsratio blijft stabiel (20 %).

## 3. Herfstbooster tegen COVID-19

Volgens wetenschappelijke modellen wordt tegen half oktober een nieuwe COVID-19-golf verwacht. De mogelijke gevolgen hiervan, namelijk meer besmettingen, ziektes, hospitalisaties en een nog hogere druk op de gezondheidszorg, kunnen ingedijkt worden indien een voldoende grote groep mensen zich laat vaccineren.

Zoals ook de Hoge Gezondheidsraad concludeerde, is het vooral voor de 50plussers, zorgpersoneel en mensen met een verminderde immuniteit belangrijk dat ze een herfstvaccin krijgen, voordat deze nieuwe golf zich aandient.

Ook alle andere volwassenen hebben de kans om een herfstvaccinatie te gaan halen.

Meer details vindt u in het wekelijkse rapport van Sciensano, dat elke vrijdagmorgen wordt gepubliceerd [COVID-19 - Epidemiologische situatie | Coronavirus Covid-19 \(sciensano.be\)](https://www.sciensano.be/nl/COVID-19-Epidemiologische-situatie-Coronavirus-Covid-19) en het Dashboard: <https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB>

Voor en tijdens de zomer kregen meer dan 630.000 inwoners van ons land (ongeveer 5 %) reeds een extra vaccin. De overgrote meerderheid zijn 80plussers en mensen met verlaagde immuniteit. Ook zij komen voor een herfstvaccinatie in aanmerking.

Meer informatie over de organisatie van de vaccinatiecampagne vindt u hier:

Vlaanderen: <https://www.laatjevaccineren.be/boostervaccinatie>

Wallonië: <https://www.jemevaccine.be/>

Brussel: <https://coronavirus.brussels/>

Ostbelgien: <http://ichlassemichimpfen.be>

## B. INFORMATIE OVER APENPOKKEN


Monkeypox of Apenpokken wordt veroorzaakt door het monkeypoxvirus. Tot nu toe kwam de ziekte vooral voor in beboste delen van Centraal- en West-Afrika, met sporadisch gevallen in andere landen, gelinkt aan een reis naar deze gebieden. Sinds begin mei 2022 verspreidt de ziekte zich echter in Europa en daarbuiten, waarbij besmettingen vooral voorkomen bij mannen die seksuele contacten hebben met mannen (MSM), maar niet uitsluitend.

### 1. Aantal gevallen

Op 12 september 2022 waren er in ons land 744 bevestigde gevallen van apenpokken. Het gaat om 392 gevallen in Vlaanderen (53%), 266 gevallen in Brussel (36%) en 86 gevallen in Wallonië (11%).

Bij de gevallen waarvoor het geslacht gekend is zijn er 735 mannen, 4 vrouwen, en 2 personen die zich anders identificeren. De leeftijd voor de grote meerderheid situeert zich tussen de 16 en 71 jaar oud. Er is 1 geval gemeld bij een kind onder de drie jaar.

Figuur : Aantal gevallen per regio per week sinds 10 mei 2022, België (data laatste 3 weken nog niet volledig)



Zo goed als alle patiënten vertonen huidletsels, vooral in de anogenitale zone. Ongeveer 56% heeft ook algemene symptomen zoals koorts, algemeen onwel zijn, opgezwollen lymfeklieren, ....

Negenendertig personen werden gehospitaliseerd, 28 om te worden behandeld (waarvan 4 personen met een onderliggende immunestoornis), 3 personen omdat thuisisolatie niet mogelijk was, en 8 waarvoor de reden niet gekend was. Er werd tot op heden 1 sterfgeval gerapporteerd bij een persoon met onderliggende gezondheidsproblemen.

Op basis van de huidige gegevens over de vermoedelijke bron van transmissie, blijkt dat het virus voornamelijk wordt overgedragen via seksueel contact. Waar in het begin infectie voornamelijk via seksueel contact op grote events werd gemeld, gebeurt dat meer recent meer via seksueel contact in de privésfeer. Het risico voor de algemene bevolking wordt vandaag nog als gering ingeschat.

## 2. Vaccinatie

De 12 referentiecentra en de andere vaccinatieplaatsen vaccineren momenteel iedereen onder de huid (intradermaal), behalve mensen met immuunstoornissen. Voor een intradermale vaccinatie is slechts een vijfde van de dosis nodig, met twee vaccinaties met vier weken tussentijd. Daarnaast gaf Nederland ons 1.500 vaccins in bruikleen. Door dit alles werden de voorwaarden voor preventieve vaccinatie versoepeld:

- Preventieve vaccinatie bij
  - mannen die seks hebben met mannen (MSM) en die de voorbije 12 maanden minstens één labo-bewezen SOA hadden;
  - vrouwen die PrEP nemen en die frequente wisselende seksuele contacten hebben;
  - mannelijke en transgender sekswerkers
  - personen met ernstige immuunstoornissen en een hoge kans op ernstige infectie;
  - laboratoriumpersoneel dat virusculturen behandelt
- Vaccinatie na blootstelling (best binnen de 4 dagen na het contact) bij
  - immuungecompromitteerden na een hoogrisico contact (bv besmet gezinslid of het delen van kleding, beddengoed, keukengerei met een patiënt met huiduitslag);
  - personen na een zeer hoogrisico contact (bv. seksueel contact, langdurig huid-op-huidcontact met een persoon met huiduitslag of een wonde);
  - zorgpersoneel na een hoogrisico contact zonder bescherming (bv langdurig face-to-facecontact, in aanraking komen met lichaamsvloeistoffen van een besmette patiënt, blootstelling aan aerosolen).



De 12 referentiecentra nodigen de patiënten uit waarvan ze weten dat deze binnen de voorwaarden vallen. Mensen die niet gekend zijn in een referentiecentrum en die denken voor vaccinatie in aanmerking te komen kunnen contact opnemen met de (huis)arts die hun dossier kent.

De huisartsen vinden meer info hierover, en een model van verwijfsbrief [hier](#), (onder Hoofdstuk A, Brieven).

### Hoeveel vaccins werden er al toegediend in België? (cijfers van 13/9\*)

Er werden tot nu toe in totaal 1.937 vaccins toegediend, waarvan 310 na blootstelling, 1.616 vaccins werden preventief toegediend, waarvan 284 aan sexwerkers. Deze week staan er nog 985 ingepland. Er werden ook 11 tweede doses toegediend.

### Aantal vaccinaties per deelstaat (niet noodzakelijk de deelstaat waar de gevaccineerde woont, cijfers van 13/9):

- Vlaanderen: 992
- Brussel\*: 766
- Wallonie: 179

\*Door 1 referentiecentrum werd deze week geen cijfers doorgegeven

### 3. Nuttige info

Een wekelijkse epidemiologische update vindt u [op de website van Sciensano](#). Informatie voor het grote publiek is beschikbaar op de website van het Vlaamse [Agentschap Zorg en Gezondheid](#) en van de Brusselse [Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie](#).

**Elke deelstaat voorziet ook een hulplijn:**

- Vlaanderen: 1700
- Brussel: 02/214.19.29
- Wallonië: 0800/16.061
- Ost België: 0492/140 557

### C. BESLISSINGEN VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE (IMC) VOLKSGEZONDHEID

Alle persberichten van de IMC kan u vinden via de volgende link:

<https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2022-persberichten-van-de-imc>

**Voor meer informatie of interviews, contacteer:**

**Gudrun Briat**

Verantwoordelijke communicatie COVID-19

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0475/274115

Gudrun.briat@health.fgov.be